WOUNDSEAL®
TOPICAL POWDER

INSTRUCTIONS FOR USE


This package insert includes bilingual instructions for use. English instructions are below.

ESPAÑOL
Este prospecto incluye instrucciones de uso bilingües. Las instrucciones en español están en el reverso.


INS-WS-05.2

ENGLISH INSTRUCTIONS

How to Apply WoundSeal® Powder
WoundSeal is a topical powder to stop minor external bleeding. If possible, clean wound and apply powder after bleeding resumes; blood must be present for powder to work.




TWIST CAP TO REMOVE. PUNCTURE FOIL WITH END OF CAP TO OPEN.



POUR POWDER ONTO BLEEDING WOUND TO COVER COMPLETELY.

DO NOT SQUEEZE TUBE.



PRESS FOR 30 SECONDS TO FORM A PROTECTIVE SEAL (SCAB) AND STOP BLEEDING.

Repeat application as needed. For optimal powder flow, **DO NOT SQUEEZE TUBE WHEN POURING.** The protective scab may be left in place until it falls off naturally. Avoid wetting the scab for one (1) hour. Occasionally upon application of WoundSeal, a temporary warming or stinging sensation may be felt.

WOUND COVERAGE AREA:
One tube is sufficient to cover a wound area up to 3.9 cm^2 (0.6 in^2) to a depth of 2 mm.


PRODUCT REMOVAL:
If WoundSeal powder must be removed, as determined by a health-care professional, brush away loose powder, then soak wound in sterile water until scab starts loosening from the wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

INGREDIENTS:
Hydrophilic polymer and potassium ferrate

WARNINGS:
For external use only. Not intended to replace stitches. Do not apply powder to visibly infected wounds. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Keep out of reach of children.

CAUTIONS:
Store in a clean, dry place. Use by expiration date listed. Discard if product is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use since powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity.

WoundSeal is manufactured in the USA by **Biolife, LLC**
8163 25th Court East
Sarasota, FL 34243
+1 (941) 360-1300
customer.care@biolife.com
www.woundseal.com



The symbols glossary is provided electronically at: **www.biolife.com/symbols**

Patents 6,521,265 and 6,187,347.Other US and international patents pending.

WOUNDSEAL®
POLVO TÓPICO

INSTRUCCIONES DE USO

Este prospecto incluye instrucciones de uso bilingües. Las instrucciones en español están a continuación.

ENGLISH
This package insert includes bilingual instructions for use. English instructions are on reverse side.


INS-WS-05.2

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Modo de aplicación de WoundSeal® en polvo
WoundSeal es un polvo tópico para detener el sangrado externo leve. Si es posible, limpie la herida y aplique el polvo después de que se reanude el sangrado; debe haber sangre para que el polvo funcione.



GIRE LA TAPA PARA QUITARLA. PERFORE LA LÁMINA CON EL EXTREMO DE LA TAPA PARA ABRIR EL TUBO.



VIERTA EL POLVO SOBRE LA HERIDA SANGRANTE Y CÚBRALA POR COMPLETO.

NO APRIETE EL TUBO.



PRESIONE DURANTE 30 SEGUNDOS PARA QUE SE FORME UN SELLO (COSTRA) PROTECTOR Y EL SANGRADO SE DETENGA.

Repita la aplicación según sea necesario. Para que el polvo fluya de forma óptima, **NO APRIETE EL TUBO AL VERTER.** La costra protectora puede dejarse en el sitio hasta que se desprenda por sí sola. Evite mojar la costra durante una (1) hora. En algunos casos, tras la aplicación de WoundSeal, puede sentirse una sensación temporaria de calor o escozor.

ÁREA DE COBERTURA DE LA HERIDA:
Un tubo es suficiente para cubrir un área de herida de hasta 3,9 cm^2 (0,6 $pulg.^2$) con una profundidad de 2 mm.

RETIRO DEL PRODUCTO:
Si debe retirarse el polvo WoundSeal, según lo determine un profesional de la salud, quite el polvo suelto con un cepillo, luego sumerja la herida en agua esterilizada hasta que la costra empiece a desprenderse de la herida. Raspe suavemente la costra aflojada con un dedo enguantado o con un bajalenguas.

INGREDIENTES:
Polímero hidrófilo y ferrato de potasio

ADVERTENCIAS:
Solo para uso externo. No tiene por objeto sustituir las suturas. No aplique el polvo en las heridas que estén visiblemente infectadas. Puede ser nocivo si se inhala o se ingiere. Evite aspirar el producto a través de las fosas nasales o la cavidad bucal. Evite el contacto con los ojos. Si esto sucede, enjuáguese bien los ojos con agua. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES:
Guarde el producto en un lugar limpio y seco. Úselo antes de la fecha de vencimiento que se indica en el envase. Deseche el producto si está dañado o abierto, o si el polvo está grumoso y no fluye libremente. Deseche el contenido después del uso, ya que la efectividad del polvo solo se garantiza si este no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

WoundSeal es fabricado en los EE. UU. por **Biolife, LLC**
8163 25th Court East
Sarasota, FL 34243
+1 (941) 360-1300
customer.care@biolife.com
www.woundseal.com

STERILE R

Se suministra un glosario de símbolos en formato electrónico en:
www.biolife.com/symbols

Patentes 6,521,265 y 6,187,347 y otras patentes estadounidenses e internacionales pendientes.